Klimamodellierung

in Bezug auf die Entwicklung der Rechenleistung

A. Logacjov

Universität Hamburg

Juni, 2016

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen der Klimamodellierung
- 3 Klimamodellierung und die Entwicklung moderner Computer
- 4 Zusammenfassung
- 5 Literatur- und Abbildungsverzeichnis

Einleitung

Einleitung

Treibhausgase

[DIE WELT]

Einleitung

Treibhausgase

[DIE WELT]

Globale Erwärmung

Szenarien globaler Temperaturzunahme

[IPCC/MPI/DKRZ]

Einleitung

Treibhausgase

[DIE WELT]

Globale Erwärmung

Szenarien globaler Temperaturzunahme

QUELLE: IPCC / MPI, DKRZ

[IPCC/MPI/DKRZ]

Schmelzen der Polkappen

[xplora]

Entwicklung der Polargebiete November 2004]

Drastische Änderung des Klimagleichgewichts seit Industrialisierung
Fragen:

- Welche Änderungen sind anthropologischen Ursprungs?
- Welche Änderungen sind natürlichen Ursprungs?

Verstehen des Klimasystems von größtem Interesse
Zukunftsprognosen möglich

Der Klimawandel

Messtation Mauna Loa liefert seit 58 Jahren CO_2 Gehalt des Vulkan Mauna Loa wichtig: kaum lokale menschliche oder natürliche Einflüsse am Klima

[wikipedia]

Der Klimawandel

Messtation Mauna Loa liefert seit 58 Jahren CO_2 Gehalt des Vulkan Mauna Loa wichtig: kaum lokale menschliche oder natürliche Einflüsse am Klima

[wikipedia]

Unabhängige Belege für den Klimawandel liefern selbst Berechnungen von Versicherungen.

Klimasystem

Klimasystem sehr komplex:

[Vorlesung Hochleistungsrechnen WiSe 15/16]

Ohne Computer Verstehen nur bedingt möglich

Grundlagen der Klimamodellierung

Konzeptionelle Modelle

- Vereinfachung und Universalisierung im Vordergrund
- Grundlagenverständnis schaffen

Konzeptionelle Modelle

- Vereinfachung und Universalisierung im Vordergrund
- Grundlagenverständnis schaffen

Energiebilanzmodell:

[Steve Ackerman and John Knox US Department of Energy(ARM)]

Klimamodelle

Klimasystem so genau wie möglich abbilden
Man benötigt:

- Relevante physikalische Gleichungen
- Umsetzung in numerische Algorithmen
- Implementierung

Klimamodelle

Gleichungen sind gewöhnliche oder partielle Differentialgleichungen

$$\frac{\partial U}{\partial t} - (f + \xi) \cdot V + \dot{\eta} \frac{\partial U}{\partial \eta} + \frac{R_d T_v}{\alpha} \frac{\partial \ln p}{\partial \lambda} + \frac{1}{\alpha} \frac{\partial}{\partial \lambda} (\phi + E) = P_U + K_U \quad (2.2.1)$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} + (f + \xi) \cdot U + \dot{\eta} \frac{\partial V}{\partial \eta} + \frac{R_d T_v}{\alpha} (1 - \mu^2) \frac{\partial \ln p}{\partial \mu} + \frac{(1 - \mu^2)}{\alpha} \frac{\partial}{\partial \mu} (\phi + E) = P_V + K_V \quad (2.2.2)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{U}{\alpha(1 - \mu^2)} \frac{\partial T}{\partial \lambda} + \frac{V}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \mu} + \dot{\eta} \frac{\partial T}{\partial \eta} - \frac{\kappa T_v \omega}{(1 + (\delta - 1) q_v) p} = P_T + K_T \quad (2.2.3)$$

$$\frac{\partial q_v}{\partial t} + \frac{U}{\alpha(1 - \mu^2)} \frac{\partial q_v}{\partial \lambda} + \frac{V}{\alpha} \frac{\partial q_v}{\partial \mu} + \dot{\eta} \frac{\partial q_v}{\partial \eta} = P_{q_v} + K_{q_v} \quad (2.2.4)$$

$$\frac{\partial q_w}{\partial t} + \frac{U}{\alpha(1 - \mu^2)} \frac{\partial q_w}{\partial \lambda} + \frac{V}{\alpha} \frac{\partial q_w}{\partial \mu} + \dot{\eta} \frac{\partial q_w}{\partial \eta} = P_{q_w} + K_{q_w} \quad (2.2.5)$$

[Vorlesung Hochleistungsrechnen WiSe 15/16]

nicht direkt lösbar

Numerische Algorithmen zur Approximierung Qualität der Modelle leidet

Möglichkeiten

Moderne Klimamodelle

- Fördern Verständnis

Möglichkeiten

Moderne Klimamodelle

- Fördern Verständnis
- Vergangenes Klima nachbilden
- Heutiges Klima nachbilden
- Ermöglichen Zukunftsprognosen

Möglichkeiten

Moderne Klimamodelle

- Fördern Verständnis
- Vergangenes Klima nachbilden
- Heutiges Klima nachbilden
- Ermöglichen Zukunftsprognosen
 - Hier fließen Annahmen mit ein
 - Eingabedaten bestimmen den Verwendungszweck
 - Höchster Aufwand bei Aufbereitung der Eingabedaten

Möglichkeiten

Moderne Klimamodelle

- Fördern Verständnis
- Vergangenes Klima nachbilden
- Heutiges Klima nachbilden
- Ermöglichen Zukunftsprognosen
 - Hier fließen Annahmen mit ein
 - Eingabedaten bestimmen den Verwendungszweck
 - Höchster Aufwand bei Aufbereitung der Eingabedaten
- Bauen auf Wettervorhersagen auf
- Benötigen ggf. sehr viel Rechenleistung

Möglichkeiten

Moderne Klimamodelle

- Fördern Verständnis
- Vergangenes Klima nachbilden
- Heutiges Klima nachbilden
- Ermöglichen Zukunftsprognosen
 - Hier fließen Annahmen mit ein
 - Eingabedaten bestimmen den Verwendungszweck
 - Höchster Aufwand bei Aufbereitung der Eingabedaten
- Bauen auf Wettervorhersagen auf
- Benötigen ggf. sehr viel Rechenleistung

Große Herausforderung für Computer und Wissenschaftler

Klimamodellierung und die Entwicklung moderner Computer

Numerische Wettervorhersagen (NWP)

Erste Wettersimulation 1950

- Approximation physikalischer Differentialgleichungen durch Finite-Differenzen-Methode

Numerische Wettervorhersagen (NWP)

Erste Wettersimulation 1950

- Approximation physikalischer Differentialgleichungen durch Finite-Differenzen-Methode
- D.h. Raum wird durch endliche Gitterpunkte diskretisiert
- Zeit durch endliche Zeitschritte

Numerische Wettervorhersagen (NWP)

Erste Wettersimulation 1950

- Approximation physikalischer Differentialgleichungen durch Finite-Differenzen-Methode
- D.h. Raum wird durch endliche Gitterpunkte diskretisiert
- Zeit durch endliche Zeitschritte
- Masse- und Energietransfer zwischen Gitterboxen

Numerische Wettervorhersagen (NWP)

Erste Wettersimulation 1950

- Approximation physikalischer Differentialgleichungen durch Finite-Differenzen-Methode
- D.h. Raum wird durch endliche Gitterpunkte diskretisiert
- Zeit durch endliche Zeitschritte
- Masse- und Energietransfer zwischen Gitterboxen
- Regionale Betrachtung, starke Vereinfachung, nur Atmosphäre

Numerische Wettervorhersagen (NWP)

Erste Wettersimulation 1950

- Approximation physikalischer Differentialgleichungen durch Finite-Differenzen-Methode
- D.h. Raum wird durch endliche Gitterpunkte diskretisiert
- Zeit durch endliche Zeitschritte
- Masse- und Energietransfer zwischen Gitterboxen
- Regionale Betrachtung, starke Vereinfachung, nur Atmosphäre

Numerische Wettervorhersagen (NWP)

ENIAC Rechner mit ca. 500 FLOPS 24h Wetterprognose möglich

[Energy Dinosaurs by edro 2007]

General Circulation Models (GCM)

- Selbe Technik wie NWP (Raum und Zeit diskretisieren)
- Nur global und größere Zeitabstände
- Physikalische Phänomene zwischen Gitterboxen berechnen

General Circulation Models (GCM)

- Selbe Technik wie NWP (Raum und Zeit diskretisieren)
- Nur global und größere Zeitabstände
- Physikalische Phänomene zwischen Gitterboxen berechnen

[History of climate modeling Paul N. Edwards 2011]

General Circulation Models (GCM)

Erster GCM von Phillips (1955)

- 2 Schichten, 17×16 Gitterpunkte
- Simulierte Oberfläche: $10.000\text{km} \times 6000\text{km}$
- Simulierte Zeit: 130 Tage

General Circulation Models (GCM)

Erster GCM von Phillips (1955)

- 2 Schichten, 17×16 Gitterpunkte
- Simulierte Oberfläche: $10.000\text{km} \times 6000\text{km}$
- Simulierte Zeit: 130 Tage

Der Rechner

- IAS-Computer
- 1kB Hauptspeicher
- 2kB Magnetspeicher

[computerhistory.org Birth of the Computer]

realistische Prognosen

Genauigkeit vs. Rechenleistung

Auflösung

Gitterboxen sehr groß

Klimaverhalten auf kleineren Räumen nicht berechenbar

Modell T21

Genauigkeit vs. Rechenleistung

Auflösung

Jedoch:

Höhere Auflösung höhere Genauigkeit aber mehr Leistung nötig

Halbierung der
Auflösung, 16-fache
Leistung nötig

Genauigkeit vs. Rechenleistung

Auch Verbesserung der Genauigkeit durch:

- Anzahl zu berechnender physikalischer Prozesse
 - Hängt mit Auflösung zusammen
 - Stattfinden einiger Prozesse auf Subgitterebene nicht berechenbar
 - Lösung: Parametrisierung

Genauigkeit vs. Rechenleistung

Auch Verbesserung der Genauigkeit durch:

- Anzahl zu berechnender physikalischer Prozesse
 - Hängt mit Auflösung zusammen
 - Stattfinden einiger Prozesse auf Subgitterebene nicht berechenbar
 - Lösung: Parametrisierung
- Anzahl von Subsystemen und Komponenten des Klimas
 - Atmosphäre, Ozean, Biosphäre, Kryosphäre usw.
 - Zusammenspiel dieser sehr wichtig
 - Mehr Komponenten mehr Leistung nötig
 - Mehrere Komponenten zusammen ergeben gekoppelte Modelle

Genauigkeit vs. Rechenleistung

Subsysteme und Komponenten

AOGCM:

[Komplexe Klimamodelle(GCMs) Dr. Dieter Kasang 08.2014]

Timeline

1955-1995

Landoberfläche zu gekoppelten Modellen hinzu

[Komplexe Klimamodelle(GCMs) Dr. Dieter Kasang 08.2014]

Timeline

1955-1995

1985 Control Data Cyber-205(DKRZ)

- 1 Prozessor/Kern
- 0.2 GigaFLOPS
- 0.032 GB Hauptspeicher

[Rechnerhistorie am DKRZ]

1985 Control Data Cyber-205(DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 1 Prozessor/Kern
 - 0.2 GigaFLOPS
 - 0.032 GB Hauptspeicher
-
- Simulationen mit 3D-Atmosphären-
ODER Ozeanmodellen
 - Ergebnisdaten: 4 GB
 - Simulierte Zeit: Monate oder Jahre
 - Gitterabstand Atmosphäre: 500 km

1985 Control Data Cyber-205(DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 1 Prozessor/Kern
 - 0.2 GigaFLOPS
 - 0.032 GB Hauptspeicher
-
- Simulationen mit 3D-Atmosphären-
ODER Ozeanmodellen
 - Ergebnisdaten: 4 GB
 - Simulierte Zeit: Monate oder Jahre
 - Gitterabstand Atmosphäre: 500 km

Modell T21

Timeline

1955-1995

1988 Cray 2S(DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 4 Prozessoren/Kerne
- 2 GigaFLOPS
- 1 GB Hauptspeicher
- 25 GB Festplattensystem
- 1,2 TB Magnetbandarchiv

1988 Cray 2S(DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 4 Prozessoren/Kerne
- 2 GigaFLOPS
- 1 GB Hauptspeicher
- 25 GB Festplattensystem
- 1,2 TB Magnetbandarchiv

Möglichkeiten DKRZ im Jahre 1990

1988 Cray 2S(DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 4 Prozessoren/Kerne
 - 2 GigaFLOPS
 - 1 GB Hauptspeicher
 - 25 GB Festplattensystem
 - 1,2 TB Magnetbandarchiv
-

Möglichkeiten DKRZ im Jahre 1990

- Simulationen mit gekoppeltem 3D-Atmosphäre-Ozean-Modelle

1988 Cray 2S(DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 4 Prozessoren/Kerne
- 2 GigaFLOPS
- 1 GB Hauptspeicher
- 25 GB Festplattensystem
- 1,2 TB Magnetbandarchiv

Möglichkeiten DKRZ im Jahre 1990

- Simulationen mit gekoppeltem 3D-Atmosphäre-Ozean-Modelle
- Experiment CO₂-Verdopplung
- Erste Simulationen mit kontinuierlichem CO₂-Anstieg

1988 Cray 2S(DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 4 Prozessoren/Kerne
 - 2 GigaFLOPS
 - 1 GB Hauptspeicher
 - 25 GB Festplattensystem
 - 1,2 TB Magnetbandarchiv
-

1988 Cray 2S(DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 4 Prozessoren/Kerne
 - 2 GigaFLOPS
 - 1 GB Hauptspeicher
 - 25 GB Festplattensystem
 - 1,2 TB Magnetbandarchiv
-

Möglichkeiten DKRZ im Jahre 1990

- Ergebnisdaten: 80 GB
- Simulierte Zeit: 200 Jahre
- Gitterabstand Atmosphäre: 500 km
- Zwei der vier
Atmosphäre-Ozean-Modelle
entstanden in Hamburg

Ozean+Meereis zu gekoppelten Modellen hinzu

[Komplexe Klimamodelle(GCMs) Dr. Dieter Kasang 08.2014]

Timeline

1955-1995

1994 Cray C-916(DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 16 Prozessoren/Kerne
- 16 GigaFLOPS
- 2 GB Hauptspeicher + 4 GB RAM-Disk
- 128 GB Festplattensystem
- 10 TB Magnetbandarchiv

1994 Cray C-916(DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 16 Prozessoren/Kerne
- 16 GigaFLOPS
- 2 GB Hauptspeicher + 4 GB RAM-Disk
- 128 GB Festplattensystem
- 10 TB Magnetbandarchiv

Möglichkeiten DKRZ im Jahre 1995

1994 Cray C-916(DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 16 Prozessoren/Kerne
 - 16 GigaFLOPS
 - 2 GB Hauptspeicher + 4 GB RAM-Disk
 - 128 GB Festplattensystem
 - 10 TB Magnetbandarchiv
-

Möglichkeiten DKRZ im Jahre 1995

- Simulationen mit verschiedenen möglichen Entwicklungen der CO₂-Konzentration in der Atmosphäre

1994 Cray C-916(DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 16 Prozessoren/Kerne
- 16 GigaFLOPS
- 2 GB Hauptspeicher + 4 GB RAM-Disk
- 128 GB Festplattensystem
- 10 TB Magnetbandarchiv

Möglichkeiten DKRZ im Jahre 1995

- Simulationen mit verschiedenen möglichen Entwicklungen der CO₂-Konzentration in der Atmosphäre
- Erste Regionalmodelle

1994 Cray C-916(DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

Möglichkeiten DKRZ im Jahre 1995

- Ergebnisdaten: 1 TB
- Simulierte Zeit: mehrere Jahrhunderte
- Gitterabstand Atmosphäre: 500 - 250 km

Modell T42

[Vorlesung Hochleistungsrechnen WiSe 15/16]

Einschub

Regionale Klimamodelle

Regionale Betrachtung des Klimasystems (z.B. Deutschland)

- Gitterabstand von 50 bis 2.5 km nötig
- Rand des Modells: global simulierte Werte genommen

[DKRZ/MPI-M/CSC]

Timeline

1994-2016

Sulphataerosole zu gekoppelten Modellen hinzu

[Komplexe Klimamodelle(GCMs) Dr. Dieter Kasang 08.2014]

Timeline

1994-2016

Earth System Modeling Framework(ESMF)

- Zur Entwicklung
- Und vor allem Kopplung von Klimamodellen

[25 Jahre DKRZ]

Wissenschaftler können je nach Bedarf die Modelle zusammenfügen

Timeline

1994-2016

2002 NEC SX-6 "Hurrikan" (DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 192 Prozessoren
- 1,5 TeraFLOPS
- 1,5 TB Hauptspeicher
- 60 TB Festplattensystem
- 3,4 PB Magnetbandarchiv

2002 NEC SX-6 "Hurrikan" (DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 192 Prozessoren
- 1,5 TeraFLOPS
- 1,5 TB Hauptspeicher
- 60 TB Festplattensystem
- 3,4 PB Magnetbandarchiv

Möglichkeiten DKRZ im Jahre 2004

- Berücksichtigung der Aerosole

2002 NEC SX-6 "Hurrikan" (DKRZ)

Möglichkeiten DKRZ im Jahre 2004

- Ergebnisdaten: 150 TB
- Simulierte Zeit: 5.000 Jahre
- Gitterabstand: 180 km

[Rechnerhistorie am DKRZ]

2002 NEC SX-6 "Hurrikan" (DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

Möglichkeiten DKRZ im Jahre 2004

- Ergebnisdaten: 150 TB
- Simulierte Zeit: 5.000 Jahre
- Gitterabstand: 180 km

Modell T63

[Vorlesung Hochleistungsrechnen 15/16]

Nichtsulphataerosole u. C-Kreislauf zu gekoppelten Modellen hinzu

[Komplexe Klimamodelle(GCMs) Dr. Dieter Kasang 08.2014]

Dynamische Vegetation u. Atmosphärenchemie zu gekoppelten Modellen hinzu

[Komplexe Klimamodelle(GCMs) Dr. Dieter Kasang 08.2014]

Timeline

1994-2016

2009 IBM Power6 "Blizzard" (DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 8.448 Prozessoren
- 158 TeraFLOPS
- 20 TB Hauptspeicher
- 6 PB Festplattensystem
- 60 PB Magnetbandarchiv

2009 IBM Power6 "Blizzard" (DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 8.448 Prozessoren
 - 158 TeraFLOPS
 - 20 TB Hauptspeicher
 - 6 PB Festplattensystem
 - 60 PB Magnetbandarchiv
-

Möglichkeiten DKRZ im Jahre 2010

- Darstellung Kohlenstoffkreislaufs inklusive Biosphäre
- Ensemble-Simulationen

2009 IBM Power6 "Blizzard" (DKRZ)

Möglichkeiten DKRZ im Jahre 2010

- Ergebnisdaten: 1 PB
- Simulierte Zeit: 10.000 Jahre
- Gitterabstand: 180-50 km

[Rechnerhistorie am DKRZ]

Modell T106

[Vorlesung Hochleistungsrechnen WiSe 15/16]

Einschub

Ensemble-Simulationen

- Resultate eines Modells unterscheiden sich bei geringer Anfangsbelegung
- Das Resultat ist also nur EINE Realisierung des berechneten Klimas
- Mehrmaliges Ausführen mit verschiedenen Anfangsbelegungen
- Mittel der Ergebnisse = Ensemble
- Mittel unterschiedlicher Modelle = Multi-Modell-Ensemble

Dynamische Eisschilde zu gekoppelten Modellen hinzu

[Komplexe Klimamodelle(GCMs) Dr. Dieter Kasang 08.2014]

Timeline

1994-2016

2015 Bull/Atos bullx B700 DLC "Mistral" (DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- 36.000/68.000 Prozessoren
- 1.4/3 PetaFLOPS
- 120/240 TB Hauptspeicher
- 20/50 PB Festplattensystem
- 500 PB Magnetbandarchiv

2015 Bull/Atos bullx B700 DLC "Mistral" (DKRZ)

[Rechnerhistorie am DKRZ]

- Wolkenauflösendes Regionalmodell für Deutschland mit 25 Milliarden Gitterzellen
- Ergebnisdaten: 1-20 PB
- Simulierte Zeit: Monate bis 100.000 Jahre
- Gitterabstand Globalmodelle:
 - 40 km Atmosphäre
 - 10 km Ozean

Zusammenfassung

Die besten Computer

Rasant aufwärts

Seit 1993 ist die Rechenleistung der Top500 der Welt und am DKRZ um das 10.000- bis 100.000-Fache gestiegen.

[25 Jahre DKRZ]

Folgen

- Starke Entwicklung bringt bessere Modelle

Folgen

- Starke Entwicklung bringt bessere Modelle
- Bessere Modelle liefern bessere Ergebnisse

Folgen

- Starke Entwicklung bringt bessere Modelle
- Bessere Modelle liefern bessere Ergebnisse
- Doch:
 - Rechenleistung kommt an die Grenzen
 - Bessere Modelle liefern extrem viele Daten

Folgen

- Starke Entwicklung bringt bessere Modelle
- Bessere Modelle liefern bessere Ergebnisse

- Doch:
 - Rechenleistung kommt an die Grenzen
 - Bessere Modelle liefern extrem viele Daten
 - Akt.: 8 PB/Jahr zu speichern

Folgen

- Starke Entwicklung bringt bessere Modelle
- Bessere Modelle liefern bessere Ergebnisse

- Doch:
 - Rechenleistung kommt an die Grenzen
 - Bessere Modelle liefern extrem viele Daten
 - Akt.: 8 PB/Jahr zu speichern
 - Langes und aufwändiges Postprocessing

Schlussworte

- Klimamodelle bleiben mit Einschränkungen und Unsicherheiten verbunden
- Gesamtes Klimasystem momentan nicht abbildbar
- Entstehung von Ungenauigkeiten die zu Fehler führen
- Helfen jedoch beim Verständnis des Klimasystems
- Durch regionale Modelle kann Klima auf unterschiedlichen Skalen simuliert werden
- Ensembles sorgen für bessere Ergebnisse
- Ungewissheit der Entwicklung des menschlichen Einflusses bleibt jedoch immer bestehen

Literatur- und Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

- 1 <http://www.welt.de/debatte/kommentare/article13464937/Die-Atmosphaere-ist-keine-Gratis-Muellhalde.html>; Abgerufen am 31.Mai 2016 um 02:30 Uhr
- 2 <http://www.xplora.org/downloads/Knoppix/ESPERE/ESPEREdez05/ESPEREde/www.atmosphere.mpg.de/media/archive/5981.jpg>; Abgerufen am 31.Mai 2016 um 02:30 Uhr
- 3 https://wr.informatik.uni-hamburg.de/teaching/wintersemester_2015_2016/hochleistungsrechnen; Abgerufen am 31. Mai 2016 um 18:57 Uhr
- 4 http://serc.carleton.edu/earthlabs/weather_climate/lab_2.html; Abgerufen am 31.Mai 2016 um 21:16 Uhr
- 5 <https://msrb.wordpress.com/2007/12/04/energy-dinosaurs/>; Abgerufen am 01. Juni 2016 um 23:36 Uhr

Abbildungsverzeichnis

- 6 History of climate modeling von Paul N. Edwards, 2011
- 7 https://wr.informatik.uni-hamburg.de/teaching/wintersemester_2015_2016/hochleistungsrechnen
Foliensätze: Visualisierung in der Klimaforschung, Klimaforschung und Hochleistungsrechnen
- 8 <http://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/92/365>; Abgerufen am 02. Juni 2016 um 00:10 Uhr
- 9 <http://www.klimanavigator.de/dossier/dossiers/011976/index.php>; Abgerufen am 03. Juni 2016 um 13:27 Uhr
- 10 <https://www.dkrz.de/about/aufgaben/dkrz-geschichte/rechnerhistorie-1>; Abgerufen am 04. Juni 2016 um 18:09 Uhr

Abbildungsverzeichnis

11 [https://www.dkrz.de/pdfs/downloads/25_Jahre_DKRZ.pdf?lang=de;](https://www.dkrz.de/pdfs/downloads/25_Jahre_DKRZ.pdf?lang=de)
Abgerufen am 05. Juni 2016 um 00:56 Uhr

12 http://www.esrl.noaa.gov/gmd/webdata/ccgg/trends/co2_data_mlo.png
Abgerufen am 08.06.2016 um 01:47 Uhr

Literaturverzeichnis

- 1 https://wr.informatik.uni-hamburg.de/teaching/wintersemester_2015_2016/hochleistungsrechnen;
Abgerufen am 31. Mai 2016 um 19:32 Uhr
Foliensätze:
Klimaforschung und Hochleistungsrechnen
- 2 Herbert Stachowiak: Allgemeine Modelltheorie, 1973, S. 131–133
- 3 Das Klimasystem und seine Modellierung: Eine Einführung von Hans von Storch, Stefan Güss, Martin Heimann, 1999, S. 6-7
- 4 History of climate modeling von Paul N. Edwards, 2011
- 5 <http://www.klimanavigator.de/dossier/dossiers/011976/index.php>;
Abgerufen am 03. Juni 2016 um 13:27 Uhr

Literaturverzeichnis

- 6 <https://www.dkrz.de/about/aufgaben/dkrz-geschichte/rechnerhistorie-1>; Abgerufen am 04. Juni 2016 um 18:09 Uhr
- 7 https://www.dkrz.de/pdfs/downloads/25_Jahre_DKRZ.pdf?lang=de; Abgerufen am 05. Juni 2016 um 00:56 Uhr
- 8 <http://www.esrl.noaa.gov/gmd/obop/mlo/>; Abgerufen am 08.06.2016 um 01:47 Uhr
- 9 <http://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/eisschild/3902>; Abgerufen am 13. Juni 2016 um 13:12 Uhr